

产品货号	G05F186S	G05F186M	贮存条件
产品规格	25T	50T	-20°C
NcoI	25 μL	50 μL	-20°C
10×Buffer	60 μL	120 μL	-20°C
10×Color Buffer	60 μL	120 μL	-20°C


### 【产品介绍】

本产品 NcoI 为经过基因工程重组的快速内切酶，可以在 5~15min 内精确完成 DNA 切割。适用于质粒 DNA、PCR 产物或基因组 DNA 等的快速酶切。

本产品 NcoI 快速内切酶具有如下特点：

- 5~15min 内即可完成酶切反应；
- 共用同一种酶切 Buffer，大大简化酶切反应体系；
- 优异的酶活冗余度，轻松应对底物过量或困难模板酶切；
- 去磷酸化、连接试剂在本酶切 Buffer 中具有 100% 活性，支持一管化反应，完成“酶切 - 修饰 - 连接”过程。

### 【产品信息】

- 酶切位点： 
- 最适反应温度：37°C
- 失活条件：80°C 孵育 20min
- Dam、Dcm、CpG、EcoKI、EcoBI 甲基化修饰均无影响
- 同裂酶：Bsp19I
- 3 h 温育未表现星号活性，延时酶切可能出现星号活性

### 【使用方法】

#### 1. DNA 快速酶切流程

- ① 在低温冰盒上建立如下体系：

试剂	质粒 DNA	PCR 产物	基因组 DNA
ddH <sub>2</sub> O	15 μL	16 μL	30 μL
10×Buffer 或 10×Color Buffer	2 μL	3 μL <sup>a</sup>	5 μL
底物 DNA	2 μL (~1 μg)	10 μL (~0.2 μg)	10 μL (~5 μg)
NcoI	1 μL	1 μL	5 μL
总计	To 20 μL	To 30 μL	To 50 μL

a. 本体系适用于经过纯化的 PCR 产物酶切。未纯化的 PCR 产物具备一定的离子强度，10×Buffer 加入量可适当减少至 2 μL。但由于 DNA 聚合酶同时具有外切酶活性，会影响酶切产物，因此下一步需进行克隆等操作，建议酶切前对 PCR 产物进行纯化。

- ② 轻轻反复吸打以混匀（切勿涡旋），然后瞬时离心；



- ③ 在 37°C 孵育 15 min (质粒)，或 15~30 min (PCR 产物)，或 30~60 min (基因组 DNA)；
- ④ 在 80°C 温育 20 min 即可使酶失活，停止反应 (可选)。

## 2. 双酶切/多酶切

- 每种快速内切酶的用量为 1 μL，并根据需要适当扩大反应体系；
- 所有快速内切酶的体积总和不得超过总反应体系的 1/10；
- 如果所用的几种快速内切酶的最适反应温度不同，应先以最适温度低的酶开始酶切，再添加最适温度较高的酶，在其最适反应温度下进行酶切反应。

## 【质量控制】

### ➤ 功能活性检测

最适反应温度下，在 20 μL 反应体系中，1 μL NcoI 能够在 15 min 内完全消化 1 μg λDNA。

### ➤ 超长时间温育检测

最适反应温度下，将 1 μL NcoI 与 1 μg λDNA 共同温育 3h，未检测到其他核酸酶污染或星号活性引起的底物非特异性降解，延时酶切可能出现星号活性。

### ➤ 酶切-连接-再酶切检测

最适反应温度下，使用 1 μL NcoI 消化底物，回收酶切产物，在 22°C 下使用适量 Fast T4 DNA Ligase 可以将酶切产物重新连接，将连接产物再次回收后，使用相同的内切酶可以重新切开连接产物。

### ➤ 非特异性内切酶活性检测

最适反应温度下，将 1 μL NcoI 与 1 μg 超螺旋质粒 DNA 共同温育 4h，使用琼脂糖凝胶电泳检测，质粒 DNA 仍然处于超螺旋状态。

### ➤ 蓝白斑检测

将含有单一 lacZ α 基因的载体以 1 μL NcoI 消化，重新连接后转化入大肠杆菌感受态细胞，涂布在含有对应抗生素、IPTG 和 X-gal 的 LB 培养基平板上。连接正确的产物会生长出蓝色菌落，而连接错误（即 DNA 末端切口不完整）的产物将得到白色菌落。对于系列限制酶而言，白色菌落比例应小于 1%。

## 【注意事项】

- 本产品在 -20°C 下可贮存一年。
- 本产品为快切内切酶，如需过夜可在反应后放入 4°C。
- 本产品在常见其它厂家反应缓冲液中的活性为 100%。
- 仅用于科学研究用途。

## 【相关产品】

货号	产品名称	规格
G05F300	T4 Ligase	200U/1000U
G05F188	NdeI	100T/200T
G05F190	NheI	25T/50T
G05F195	NotI	25T/50T
G05F197	NruI	50T



Version: 20190106 (第一版)