

| | | | |
|-----------------|----------|----------|------|
| 产品货号 | G05F228S | G05F228M | 贮存条件 |
| 产品规格 | 50T | 100T | -20℃ |
| SalI | 50 μL | 100 μL | -20℃ |
| 10×Buffer | 150 μL | 300 μL | -20℃ |
| 10×Color Buffer | 150 μL | 300 μL | -20℃ |

【产品介绍】

本产品 SalI 为经过基因工程重组的快速内切酶,可以在 5~15min 内精确完成 DNA 切割。适用于质粒 DNA、PCR 产物或基因组 DNA 等的快速酶切。

本产品 SalI 快速内切酶具有如下特点:

- 5~15min 内即可完成酶切反应;
- 共用同一种酶切 Buffer, 大大简化酶切反应体系;
- 优异的酶活冗余度, 轻松应对底物过量或困难模板酶切;
- 去磷酸化、连接试剂在本酶切 Buffer 中具有 100%活性, 支持一管化反应, 完成“酶切 - 修饰 - 连接”过程。

【产品信息】

- 酶切位点:

$$5' \dots \overset{\blacktriangledown}{G} T C G A C \dots 3'$$

$$3' \dots C A G C T \overset{\blacktriangle}{G} \dots 5'$$
- 最适反应温度: 37℃
- 失活条件: 80℃ 孵育 20min
- 受 CpG 甲基化影响, 序列完全重叠, 剪切阻断
- Dam、Dcm、EcoBI、EcoKI 甲基化修饰无影响
- 3 h 温育未表现星号活性, 延时酶切可能出现星号活性

【使用方法】

1. DNA 快速酶切流程

① 在低温冰盒上建立如下体系:

| 试剂 | 质粒 DNA | PCR 产物 | 基因组 DNA |
|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| ddH ₂ O | 15 μL | 16 μL | 30 μL |
| 10×Buffer 或 10×Color Buffer | 2 μL | 3 μL ^a | 5 μL |
| 底物 DNA | 2 μL (~1 μg) | 10 μL (~0.2 μg) | 10 μL (~5 μg) |
| SalI | 1 μL | 1 μL | 5 μL |
| 总计 | To 20 μL | To 30 μL | To 50 μL |

a. 本体系适用于经过纯化的 PCR 产物酶切。未纯化的 PCR 产物具备一定的离子强度, 10×Buffer 加入量可适当减少至 2 μL。但由于 DNA 聚合酶同时具有外切酶活性, 会影响酶切产物, 因此如下一步需进行克隆等操作, 建议酶切前对 PCR 产物进行纯化。

② 轻轻反复吸打以混匀(切勿涡旋), 然后瞬时离心;

③ 在 37℃ 孵育 15 min (质粒), 或 15~30 min (PCR 产物), 或 30~60 min (基因组 DNA);

④ 在 80℃ 温育 20 min 即可使酶失活，停止反应（可选）。

2. 双酶切/多酶切

- 每种快速内切酶的用量为 1 μL，并根据需要适当扩大反应体系；
- 所有快速内切酶的体积总和不得超过总反应体系的 1/10；
- 如果所用的几种快速内切酶的最适反应温度不同，应先以最适温度低的酶开始酶切，再添加最适温度较高的酶，在其最适反应温度下进行酶切反应。

【质量控制】

➤ 功能活性检测

最适反应温度下，在 20 μL 反应体系中，1 μL SalI 能够在 15 min 内完全消化 1 μg λDNA (HindIII digest)。

➤ 超长时间温育检测

最适反应温度下，将 1 μL SalI 与 1 μg λDNA (HindIII digest) 共同温育 3h，未检测到其他核酸酶污染或星号活性引起的底物非特异性降解，延时酶切可能出现星号活性。

➤ 酶切-连接-再酶切检测

最适反应温度下，使用 1 μL SalI 消化底物，回收酶切产物，在 22℃ 下使用适量 Fast T4 DNA Ligase 可以将酶切产物重新连接，将连接产物再次回收后，使用相同的内切酶可以重新切开连接产物。

➤ 非特异性内切酶活性检测

最适反应温度下，将 1 μL SalI 与 1 μg 超螺旋质粒 DNA 共同温育 4h，使用琼脂糖凝胶电泳检测，质粒 DNA 仍然处于超螺旋状态。

➤ 蓝白斑检测

将含有单一 lacZ α 基因的载体以 1 μL SalI 消化，重新连接后转化入大肠杆菌感受态细胞，涂布在含有对应抗生素、IPTG 和 X-gal 的 LB 培养基平板上。连接正确的产物会生长出蓝色菌落，而连接错误（即 DNA 末端切口不完整）的产物将得到白色菌落。对于系列限制酶而言，白色菌落比例应小于 1%。

【注意事项】

- 本产品可在 -20℃ 下可贮存一年。
- 本产品为快切内切酶，如需过夜可在酶切反应后放入 4℃。
- 本产品常见其它厂家反应缓冲液中的活性为 100%。
- 本产品仅用于科学研究用途。

【相关产品】

| 货号 | 产品名称 | 规格 |
|---------|-----------|------------|
| G05F300 | T4 Ligase | 200U/1000U |
| G05F233 | Sbfl | 25T |
| G05F243 | SmaI | 50T/100T |
| G05F248 | SphI | 25T |
| G05F251 | SspI | 25T/50T |



Version: 20190106 (第一版)